

MODALITES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS PAR VOIE ORALE

Comprimés classiques, non enrobés : A avaler avec un verre d'eau

Un comprimé sécable peut être cassé en le posant sur une table, la barrette de section étant côté table, et appuyer légèrement de part et d'autre de la barrette. **CALCIPRAT 500**



Comprimés enrobés, dragéifiés ou pelliculés : Ne pas croquer et avaler sans sucer avec un peu d'eau.

L'enrobage protège le principe actif contre la lumière et les agents atmosphériques, permet de masquer un goût ou une odeur désagréable. **KAMOX CLAV 625MG**

Comprimés gastro-résistants : Ne pas croquer ni sucer ni écraser. A avaler avec un peu d'eau. **INEXIUM**

Comprimés et gélules à libération prolongée (LP) : Ne pas croquer ni écraser. A avaler avec un peu d'eau. A prendre de préférence 1h avant le repas. **LOXEN LP**



Comprimés effervescents : A dissoudre dans un verre d'eau jusqu'à dissolution totale avant administration. **SANDOZ CALCIUM FORT 500MG**

Comprimés dispersibles : A dissoudre dans un demi-verre d'eau. **FLANID**

Comprimés orodispersibles : Ne pas croquer, à sucer ou à laisser fondre sous la langue. **OROPERIDYS**

Comprimés à croquer ou à sucer : A sucer ou à mâcher. **DESKA VITAMINE C 500MG**

Gélules dures : Prendre avec un verre d'eau pour éviter que la gélule ne colle à l'œsophage. Ne pas ouvrir, sauf mention contraire. **DESKA AMOXICILLINE 500mg**



Capsules molles : Ne pas croquer, ne pas écraser, ne pas ouvrir. A avaler avec un verre d'eau. **TIMOFEROL**



Granules homéopathiques : A laisser fondre sous la langue.

Lyocs ou comprimés sublinguaux: A laisser fondre sous la langue. Par dissolution ou dispersion dans l'eau. Par délitement ou en les croquants dans la bouche. **SPASFON LYOC**

Gouttes et solutés buvables : A avaler pures ou diluées dans un peu d'eau. Utiliser le dispositif de mesure présent dans le conditionnement. **CORORANGE**

Suspensions buvables : Bien agiter une suspension avant de s'en servir. **DIGUSIL**

NB :

1 cuillère à soupe = 15ml

1 cuillère à dessert = 10ml

1 cuillère à café = 5ml

Poudres ou granulés en sachet : A dissoudre dans l'eau ou à mettre en suspension dans l'eau, avant administration. **AUGMENTIN 500MG**

Ampoules buvables : Diluer le contenu d'une ampoule dans un demi-verre d'eau. **REVITALOSE**



CONSERVATION DES MEDICAMENTS

Les médicaments **doivent être** rangés dans un endroit répondant aux conditions suivantes :

- à l'abri de l'humidité;
- à l'abri d'une lumière directe;
- à l'abri du gel ou d'une chaleur excessive;
- hors de la portée des enfants et des animaux.
- Certains médicaments doivent être conservés entre 2°C et 8°C, au réfrigérateur.

Eviter les endroits exposés à des variations de température et d'humidité :

- la salle de bain;
- la voiture (ex. : boîte à gants);
- les surfaces situées près de la cuisinière ou du four;
- le bord d'une fenêtre laissant passer les rayons du soleil.
- Ne jamais congeler un médicament



* En cas de symptômes importants ou d'aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.

